



■ 1  $x, y$  の分母をそれぞれ有理化すると,  $x = -5 - 2\sqrt{6}$ ,  $y = -5 + 2\sqrt{6}$

これより,  $x + y = -10$ ,  $x - y = -4\sqrt{6}$ ,  $xy = 1$  である。

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y) = -10 \cdot (-4\sqrt{6}) = 40\sqrt{6}$$

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2) = (-4\sqrt{6}) \cdot (x^2 + 1 + y^2) \cdots ①$$

ここで,  $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = (-10)^2 - 2 = 98$  なので,

$$\text{①は, } (-4\sqrt{6}) \cdot 99 = -396\sqrt{6}$$

■ 2  $x$  の分母を有理化すると,  $x = 3 + \sqrt{7}$

$2 < \sqrt{7} < 3$  だから,  $\sqrt{7}$  の整数部分は 2。

これより,  $x$  の整数部分は  $3 + 2$  で 5 だとわかる。つまり,  $a = 5$

$x$  全体から  $x$  の整数部分をひくと,  $x$  の小数部分が残る。

つまり,  $b = x - a$  なので,  $b = (3 + \sqrt{7}) - 5 = \sqrt{7} - 2$

$$\text{よって, } a^2 - 2b^2 = 25 - 2(\sqrt{7} - 2)^2 = 25 - 2(7 - 4\sqrt{7} + 4) = 3 + 8\sqrt{7}$$